

Batiordin Cözelti

Formülasyon şekli : Cözelti

Aktif Madde: (%10 serbest iyon içeren) pirolidon polivinil iyon kompleksi %10
Cas no: 25655-41-8

Yardımcı maddeler: Yumugatıcı : % 1,6
Tansiyaktif : % 0,25
Çözücü(d.su): %68,15

KULLANILACAGI ZARARLI ORGANIZMALAR

Zararı türüne göre , formülasyon şecline ve ürün tipine göre uygulama oranları:

Zararı Türü - Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.	Yaraların çevresinin temizlenmesinde bakterisit ve fungisit olarak kullanılır.	Direk uygulanır.	Gerektiğinde.
Enterococcus hirae, Candida albicans.			

Kullanma şekli :

Cilt ve yara çevresinin temizlenmesinde, özellikle mukoza membranında, ameliyat öncesi sahanın hazırlanmasında, dış genital organların çevresinin temizlenmesinde, biyopsi, enjeksiyon, el ve kan alma işlemesinde bakterisit ve fungisit olarak kullanılır.

Batiordin Cözelti seyyrettilmemiş şekilde ilgili bölgenin çevresine sürürlür, 2-3 dakika kuruması beklenir. Oluşan gözenekli film sonrasında yikanarak temizlenebilir. Ayrıca tampon yapılarak kullanılabilir.

Ticari şekilleri :

Net miktarı : (kg veya L) : 0,03 litre
0,1 litre
1 litre

Ambalaj açılmış ürünü 18 ay sürede kullanınız.
Ürünün normal saklama koşullarında rat ömrü 3 yıldır.

COÇUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UGULAMA VE HAZIRLIK ASAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ,
İÇMЕYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM
TALİMATINA UYUNUZ.

KULLANMADAN ÖNCÉ ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ

Zehriyelik belirtileri: Yanlışlıkla yutulduğunda iyon sindirim sisteminde tahrış edici etki yapar, ağızda metalik tat olusur. Kusma, kann ağrısı, ishal görülebilir.
LD₅₀ değerleri : LD₅₀ (oral, fare): 8100 mg/kg

Boş Ambalaj İmha Şekli:
Usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÖRÜN TİPİ (1)
İNSAN HİJYENİ İLE İLGİLİ BİYOSİDAL ÖRÜNLER
KULLANICI GURUBU :GENEL HALK

İlk yardım önlemleri

Gözde temas edenler: Gözleri hemen soğuk suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın, göz kapaklarını açık tutun. Doktorunuza başvurun.
Solumuslar: Hemen temiz havaya okşanın. Zor nitesi olursa okşanın verin. Doktorunuza başvurun.
Yutulmuşlar: Yutulursa hemen tıbbi tavyise alın ve bu ambalajı ya da etiketi gösterin. Sağlık personell olmadıkça kusturnmayı denemeyin, baygınlık halideyse ağızdan birşey vermeyin. Bebeklere mayen bir etki görüldüğünde doktorunuza arayınız.

Antidot: Netezleme

Yanlışlıkla içindiğinde zehriyene yol açar. Kimyasal antidotu sodyum tiyosülfatır. Ağrı yolu ile oian zehriyene halinde derhal %5'lük niğasta müsilajı ve %1'lik sodyum tiyosülfat solusyonu ile müdahale yapılır.

**ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NIN
114 NOFİ TELEFONUNU ARAYINIZ.**

ÖRÜN KULLANILIRKEN DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Eşleçleme: Kılıfı kapatın. Işı ve ateş kaynaklarından uzak tutun. Yutmayın, solumayın ve gözle temasından kaçının.
Depolama: Neme duyarlıdır. 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, pocukları görmeyeyeceği, erişmeyeceği yerlerde, orijinal ambalajında ve ağız sıkıca kapalı olarak, saklayıniz. Ambalaj Metzemesi: Renkli cam şişe, renkli plastik şişe, renkli pet şişe.

Göze temas ettiğimde:

Yutulmamalıdır.

Ariar ıçın zehirildir.

Balıkçılık ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

ZARARLIK VE AÇIKLAMASI

H315 Cilt tahrışlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

ONLEM VE AÇIKLAMASI

P284 Eşleçlemeden sonra su ile lüke yıkayın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdafale:

P302+P362 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE İSE : Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

P310 Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktorun arayın.

P321 Özel müdahale gereki (erikate bakın).

P332+P313 Ciltte tıhnat söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdafale alın.

P362 Kirmanlı gıysilerinizi çıkarın ve yanından kullanmadan önce yıkayın.

Zehirlik Tanımlaması:

Yerel yönetimllerde ve AB direktifleri çerçevesinde tıhhilek olarak sınıflandırılmıştır.

Zararlılığı işaretleri

GHS05

GHS07



Öretici firmaların edi ve adresi:

Merkez Lab. İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sarı Çelik Bulvarı, Ayça Sok. No:8 Taşdelen - Çekmeköy / İstanbul

Ruhast sanhbının edi ve adresi :

Angelin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. RSD 4, Nispiye
Mah. Aytar Cad. Fecil Ebcioğlu Sok. No:4, Zemin
Kat, Levent, Beşiktaş - İSTANBUL

Şehit Bakani Ruhast Tarihi ve Numarası :

09.01.2003 - 2012/67

DİKKAT HARİCEN KULLANILIR İÇİLMEZ.